

## 接種の順番

いろいろな予防接種をどの順番に受けたらよいのか迷うことが多いと思います。参考までに当院がおすすめするスケジュールを紹介します。①は1回目、②は2回のことです。

- (1) 生後 2 か月 肺炎球菌① B型肝炎① 5種混合① ロタウイルス①から開始 ただしロタウイルスワクチンは生後 14 週 6 日目までに開始する必要があります。
- (2) 生後 3 か月 3 か月健診と一緒に肺炎球菌② B型肝炎② 5種混合② ロタウイルス②
- (3) 生後 4 か月 肺炎球菌③ 5種混合③
- (4) 生後 5 か月 BCG
- (5) 生後 6 か月 日本脳炎①
- (6) 生後 7 か月 7 か月健診と一緒に日本脳炎②と B型肝炎③
- (7) 1歳になったら 1歳健診と一緒に麻疹風疹① 水痘① おたふくかぜ① 肺炎球菌④ 5種混合④
- (8) 2歳までに日本脳炎③ 水痘②
- (9) 小学校入学前の1年間に 麻疹風疹②。おたふくかぜ②  
3種混合(DPT)⑤ + 不活化ポリオ(IPV)⑤の追加接種も推奨されています。

- (10) 9歳になったら 日本脳炎④
- (11) 11歳になったら 2種混合(DT) もしくは 3種混合(DPT)
- (12) 女子は小学6年生になったら HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)を2回

他に毎年インフルエンザがあります。お子さんの健康状態、受ける（すでに受けた）ワクチンが生か不活化か、病気の流行具合、なども考えてスケジュールを決めていくのですが、実際にわかりにくいことが多いと思います。どうぞお気軽にご相談ください。

**松井小児科 (0743-74-2705)**

## 接種間隔

ワクチンには生きた細菌やウイルスを弱毒化した生ワクチンと殺して有効な成分だけを取り出した不活化ワクチンがあります。一般に生ワクチンには病原性はありませんが、ウイルスが生きている分効果が強いですが、発熱などの症状がでることがあります。不活化ワクチンは副作用がほとんどないかわりに効果が長続きせず追加接種が必要です。2020年10月から接種間隔の制限は緩和され、注射生ワクチンどうしの接種のみ4週間の間隔が必要になりました。

普通のかぜなら解熱後1週間以上たっていて全身状態がよければ、かぜ症状が残っていても受けられますが、麻疹、風疹、水痘などの罹患した場合 1か月程度は接種を控えます。川崎病などの治療でガンマグロブリン大量療法を受けた場合は接種まで 6カ月以上の間隔をあけます。